

Pracovní list č. 1 – vzorové řešení

1. Co všechno ovlivňuje úmrtí kojenců?

Úmrtí kojenců ovlivňuje především prostředí, ve kterém matka, žije, úroveň jejího vzdělání, kouření cigaret během těhotenství, politická nebo zdravotní situace apod.

2. Jaké příčiny v současnosti patří mezi nejčastější důvody úmrtí osob na evropském území?

Mezi nejčastější příčiny na evropském území v současnosti patří rakovina (konkrétně rakovina tlustého střeva, rakovina prsu u žen a u mužů rakovina plic), nemoci oběhové soustavy (zejména srdeční nebo mozková příhoda) a nemoci způsobené infekcí dýchacích cest (např. zánět plic – ovlivněno věkem člověka).

3. Utvoř správné dvojice:

1. Míra kojenecké úmrtnosti	A. Průměrná hodnota v Česku 82,1 let	1 H
2. Maďarsko	B. Nárůst podílu úmrtí v Evropě v letech 2005–2015	2 I
3. Nemoci oběhové soustavy	C. Nejčastější příčina úmrtí v Evropě	3 J
4. Sebevraždy a dopravní nehody	D. Průměrná hodnota 3,6 ‰ ve státech EU	4 K
5. Naděje dožití	E. 7,4 ‰ – nejvyšší míra úmrtnosti v roce 2016	5 A
6. Nemoci nervového systému	F. Nejvyšší počet úmrtí na nemoc oběhové soustavy	6 B
7. Míra kojenecké úmrtnosti	G. Nemoc úzce spojená s věkem člověka	7 D
8. Rakovina	H. Indikátor ekonomické vyspělosti státu	8 C
9. Malta	I. Nejvyšší počet úmrtí na rakovinu plic a rakovinu tlustého střeva	9 E
10. Infekce dýchacích cest	J. Průměrný počet úmrtí 1,27 ‰ – vysoký krevní tlak, cholesterol, cukrovka apod.	10 G
11. Litva	K. Nejméně časté příčiny úmrtí	11 F